

**PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO RIESGO CARDIOVASCULAR
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 2010**

Estado	Indicador	Meta indicador	Meta Estatal
AGS	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	33.0
AGS	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
AGS	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	89.9
AGS	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.1
AGS	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
AGS	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.6
BCN	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	22.4
BCN	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	23.0
BCN	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
BCN	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
BCN	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	50.1
BCN	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	70.3
BCS	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	100.0
BCS	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
BCS	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
BCS	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
BCS	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
BCS	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.2
CAM	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
CAM	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
CAM	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
CAM	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
CAM	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
CAM	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	70.5
CHP	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
CHP	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
CHP	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
CHP	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0

Estado	Indicador	Meta indicador	Meta Estatal
CHP	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
CHP	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.9
COA	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
COA	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
COA	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
COA	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
COA	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
COA	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	70.0
COL	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
COL	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
COL	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
COL	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
COL	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
COL	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.6
CUU	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
CUU	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
CUU	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
CUU	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
CUU	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
CUU	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	70.1
DFE	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	33.0
DFE	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
DFE	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	70.3
DFE	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
DFE	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
DFE	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	70.1
DUR	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
DUR	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
DUR	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0

Estado	Indicador	Meta indicador	Meta Estatal
DUR	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
DUR	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
DUR	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	70.2
GRO	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
GRO	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
GRO	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
GRO	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
GRO	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
GRO	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	70.0
GUA	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
GUA	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	128.6
GUA	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
GUA	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
GUA	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
GUA	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	68.2
HGO	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
HGO	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
HGO	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
HGO	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
HGO	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
HGO	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.8
JAL	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
JAL	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
JAL	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
JAL	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	0.0
JAL	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
JAL	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.9
MEX	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	17.3
MEX	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	12.5

Estado	Indicador	Meta indicador	Meta Estatal
MEX	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	2.8
MEX	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	0.0
MEX	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	89.1
MEX	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	2.8
MIC	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	100.0
MIC	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	100.0
MIC	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	100.0
MIC	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	90.0
MIC	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	0.0
MOR	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
MOR	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
MOR	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
MOR	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
MOR	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
MOR	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.8
NAY	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
NAY	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
NAY	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
NAY	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
NAY	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
NAY	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.7
NLE	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	100.0
NLE	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	100.0
NLE	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	100.0
NLE	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
NLE	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
NLE	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.8
OAX	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
OAX	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0

Estado	Indicador	Meta indicador	Meta Estatal
OAX	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
OAX	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
OAX	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
OAX	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.5
PUE	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
PUE	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
PUE	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
PUE	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
PUE	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.5
PUE	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
QRO	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
QRO	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
QRO	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
QRO	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	0.0
QRO	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
QRO	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	37.6
ROO	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
ROO	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
ROO	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
ROO	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
ROO	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
ROO	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	70.0
SIN	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
SIN	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
SIN	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	70.0
SIN	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
SIN	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
SIN	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	237.6

Estado	Indicador	Meta indicador	Meta Estatal
SLP	Porcentaje de detección de riesgo cardiovascular y diabetes en la población no asegurada de 20 años y más*	Meta de Resultado 1: Alcanzar el control de la presión arterial en el 51% de los pacientes en tratamiento.	0.0
SLP	Porcentaje de grupos de Ayuda Mutua acreditados	Meta de Proceso 2: Acreditar al 10% de los Grupos de Ayuda Mutua	0.0
SLP	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
SLP	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
SLP	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
SLP	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
SLP	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
SLP	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	70.3
SON	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
SON	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
SON	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
SON	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
SON	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
SON	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.9
TAB	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
TAB	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
TAB	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
TAB	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
TAB	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
TAB	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	70.1
TLA	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
TLA	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
TLA	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
TLA	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
TLA	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
TLA	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.8
TMP	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
TMP	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0

Estado	Indicador	Meta indicador	Meta Estatal
TMP	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
TMP	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
TMP	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
TMP	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.8
VER	Porcentaje de detección de riesgo cardiovascular y diabetes en la población no asegurada de 20 años y más	Meta de Resultado 1: Alcanzar una cobertura de detección del 85% en población mayor de 20 años no asegurada.	33.0
VER	Porcentaje de grupos de Ayuda Mutua acreditados	Meta de Proceso 2: Acreditar al 5% de los Grupos de Ayuda Mutua	4.1
VER	Porcentaje de pacientes en tratamiento que alcanzan cifras en control de la presión arterial	Mantener en control al menos al 40% de los los pacientes con HTA	40.0
VER	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
VER	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
VER	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
VER	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
VER	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	51.0
VER	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.9
YUC	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	73.0
YUC	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
YUC	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
YUC	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
YUC	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
YUC	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	69.8
ZAC	Porcentaje de detección de RCV en población de 20 años y más	33	33.0
ZAC	Porcentaje de detección de DM en población de 20 años y más	33	33.0
ZAC	Porcentaje de pacientes negativos a microalbuminuria	70	90.0
ZAC	Porcentaje de pacientes con obesidad que redujeron el 10% de peso corporal en UNEME EC	70	70.0
ZAC	Porcentaje de pacientes en control de su hipertensión arterial	60	60.0
ZAC	Porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que redujeron el 5% de peso corporal en GAM Acreditados	70	70.2

Estado	Indicador	Meta indicador	Meta Estatal
--------	-----------	----------------	--------------

NOTA Tomado de: <http://www.afaspe2010.net/login.jsp>
La captura de información al sistema es responsabilidad de los Servicios Estatales de Salud
La columna "meta estatal" se refiere al logro de la meta en el periodo de referencia