

Atención médica inmediata de la persona expuesta:

En exposición por contacto

En exposición por agresión

Barra de Navidad , Jalisco. 17 de Noviembre 2016

En exposición por contacto

- Únicamente se realizará lavado de la región afectada con solución antiséptica o jabón y agua a chorro.

En exposición por agresión

- a. Lavar la región afectada con solución **antiséptica o jabón**, agua a chorro durante **10 minutos**, y frotar con firmeza pero cuidando de no producir traumatismo en los tejidos, eliminando los residuos
- (el jabón neutraliza la acción del cloruro de benzalconio).



Lavar completamente
el área de la mordedura
de un animal

En exposición por agresión

- b. Para la atención de las **mucosas ocular, nasal, bucal, anal o genital**, lavar por instilación profusa con solución fisiológica, durante **5 minutos**.
- c. **Desinfectar** la herida empleando antisépticos como: alcohol al 70%, tintura de yodo en solución acuosa, povidona, o **solución de yodopovidona al 5%** o cloruro de benzalconio al 1% o bien, **agua oxigenada**.



En exposición por agresión

- d. De ser necesario, **desbridar los bordes necrosados** para favorecer el proceso de cicatrización.
- e. Valorar el cierre quirúrgico de la herida, **afrontando los bordes** con puntos de sutura mismos que deben quedar flojos y **no impedir la salida de tejido sero-hemático**, considerando si se requiere un cierre primario.



En exposición por agresión

- f. En caso de grandes heridas se debe evaluar si es necesario **referir** al paciente para atención especializada ante la posibilidad de **defectos estéticos ó funcionales**.
- g. **Antes** de realizar el **cierre quirúrgico de la herida** deberá evaluarse si es necesario aplicar la **inmunoglobulina antirrábica humana**, en caso afirmativo se infiltrará en la herida previo a este procedimiento.

En exposición por agresión

- f. En caso de grandes heridas se debe evaluar si es necesario **referir** al paciente para atención especializada ante la posibilidad de **defectos estéticos ó funcionales**.
- g. **Antes** de realizar el **cierre quirúrgico de la herida** deberá evaluarse si es necesario aplicar la **inmunoglobulina antirrábica humana**, en caso afirmativo se infiltrará en la herida previo a este procedimiento.

En exposición por agresión



Paciente masculino de 7 años de edad con herida por mordedura de perro en región craneal, **a)** y **b)** posterior a la agresión, **c)** y **d)** posterior a lavado y **e)** control a cuatro semanas.



En exposición por agresión

- h. Aplicar **toxoides tetánicos (Td)** y valorar la aplicación de **antibióticos** en heridas contaminadas.
- i. Secar y cubrir con **gasas estériles**.



En exposición por agresión

- Evaluación de Referencia Segundo o Tercer nivel:
- I. Cuando se presente una herida que ponga en **peligro la integridad, la funcionalidad o la vida de la persona expuesta**.
- II. Cuando la unidad de salud **carece de medicamentos y material de curación** necesarios para la atención médica.
- III. Cuando el paciente tiene **antecedentes de inmunodeficiencia** por una enfermedad previa o este bajo tratamiento con corticoesteroides u oncológicos.



Gracias

Referencia:

Guía para la atención médica y antirrábica de la persona expuesta al virus de la Rabia