

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



TALLER REGIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE BRUCELOSIS

Puebla, Pue. 27 al 28 de agosto

Historia Natural de la Brucelosis:

TRIADA
ECOLOGICA

HUESPED

Periodo Pre patogénico

Prevención Primaria

Periodo Patogénico

Prevención Secundaria

Prevención Terciaria

ESTIMULO

- ✓ Ingesta de Leche o Lacticios.
- ✓ Contacto directo.
- ✓ Transfusión.

Promoción de la Salud


- Mejoramiento hábitos de consumo de lácteos.
- Adecuada higiene en
- Programas preventivos salud animal.

Protección Especifica

- Pasteurización de leche.
- Modificación al ambiente.
- Vacunación del ganado.

DX Y TX


REHABILITACIÓN



Triada Ecológica

Coco-bacilo,
Intracelular, Gram
Negativo
Colonias Lisas (S) Ag 0
+
B. Abortus, B.
Mellitensis, B. Suis.

Colonias Rugosas (R) Ag
0 -
B. Ovis, B. Canis.




Afecta principalmente al sexo femenino (54%) al grupo de edad entre los 15-44 años.
Habito de consumir leche y lactacinios.

Distribución en México:
Zonas tropicales: Bovinos
Zonas semidesérticas: Caprinos

2012

Casos en la
SSA 2013

2014



FUENTE: SUIVE SEMANA 52 2012-2013/SEMANA 53 2014

2,011 casos

1,540 casos

1,439 casos

Entidad Federativa	CASOS/SSA
GUANAJUATO	529
SAN LUIS POTOSÍ	197
SINALOA	178
ZACATECAS	101
MICHOACÁN	95
TLAXCALA	82

Entidad Federativa	CASOS/SSA
GUANAJUATO	227
MICHOACÁN	250
SINALOA	165
PUEBLA	115
SONORA	82
ZACATECAS	75

Entidad Federativa	CASOS/SSA
MICHOACÁN	170
SINALOA	171
PUEBLA	161
GUANAJUATO	140
ZACATECAS	119
DURANGO	74